

แคหัวหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Markhamia stipulata</i> Seem. var. <i>stipulata</i>
ชื่อวงศ์	BIGNONIACEAE
ชื่อพื้นเมือง	แคขอนแก่น แคหางค่าง แคปทุมหมู แคยอดดำ แคหมากลิ้ม แคหมู



ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง สูงประมาณ 10- 20 ม. เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ เปลือกต้น สีเทาหรือสีน้ำตาลเป็นสะเก็ด เป็นแผ่นยาวๆ เปลือกชั้นใน สีเหลือง-ส้ม เป็นขุยๆ

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ใบย่อย มี 2-5 คู่ รูปรีหรือขอบขนาน ขนาด 6-15 x 12-26 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อยซี่ละเอียด มีขนสีน้ำตาลปกคลุมและหลุดง่ายทั้ง 2 ด้าน ใบย่อยคู่แรกค่อนข้างกลม และมีขนาดเล็กกว่าคู่ใบย่อยอื่นๆ

ดอก ออกเป็นช่อกระจจะไม้แตกแขนงตามปลายกิ่ง สีครีมหรือสีน้ำตาล-เหลือง ค่อนข้างแดง กลีบเลี้ยงมีขนนุ่มจำนวนมาก หลอดกลีบดอกรูปกรวย ปลายแยก 5 กลีบ มีตุ่มนูนหลายตุ่มที่ด้านนอก เกสรเพศผู้ มี 5 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน และเป็นหมัน 1 อัน

ผล เป็นผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก มีขนปุยหนานุ่ม มีหลายเมล็ด รูปสี่เหลี่ยม มีปีกใสทั้งสองด้าน

สถานภาพ -