

ตะคร้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Schleichera oleosa* (Lour.) Oken
 ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE
 ชื่อพื้นเมือง มะโจ๊ก เคาชะ ค้อ ตะคร้อไข่ คอส้ม



ไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 ม. เรือนยอดทึบ แผ่กิ่งก้านกว้าง ลำต้นเป็นพูพอน เปลือกต้นสีน้ำตาล-เทา มีรอยแตกเป็นแผ่นบางๆ หลุดลอกออก เมื่ออายุมากขึ้น รอยแตกจะลึกลง เปลือกชั้นในสีครีม-ชมพู

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู่ เรียงเวียนสลับ ใบย่อย 1-4 คู่ เรียงตรงข้ามรูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายใบเว้าถึงมน โคนใบ เฉียงถึงกลม ขอบใบเป็นคลื่น ใบคู่บนสุดใหญ่กว่าคู่ข้างล่าง ใบอ่อนสีแดง-ม่วงเข้มมีขนนุ่ม แล้วเปลี่ยนเป็นเขียวอ่อน ใบแก่บางผิวเรียบ มีต่อมที่มีขนในซอกเส้นใบ

ดอก เป็นดอกช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีเขียวอ่อนหรือเขียวเหลืองกลีบเลี้ยง รูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม มี 4-6 อัน เกสรเพศผู้ 5-9 อัน ยาวเป็น 3 เท่าของกลีบเลี้ยง มีขนเล็กน้อย

ผล ผลสด กลม ปลายเป็นติ่งแหลม เกือบจะไม่แตก สีเขียวสด แก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงน้ำตาล มีเนื้อใสหรือเหลือง คล้ายวุ้นหุ้มเมล็ดมี 1-2 เมล็ด รูปไข่ สีน้ำตาล-ดำ

สภาพนิเวศ พบในป่าเต็งรัง ป่าหุบเขา และป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900-1,200 ม.

สถานภาพ ไม้หวงห้ามธรรมดาประเภท ก.