


มะค่าแต้

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sindora siamensis* Teijsm. & Miq.
 ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
 ชื่อพื้นเมือง แต้ มะค่าหนาม มะค่าหุ้ม



ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 15-20 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง คล้ายร่ม เปลือกต้น สีน้ำตาลคล้ำ-ดำ แตกเป็นสะเก็ดเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้าหนา

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู่ เรียงสลับ ใบย่อย มี 3-4 คู่ เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง ขนาด 3-8 x 6-15 ซม. ปลายใบกลมหยักเว้าตื้น โคนใบสอบหรือกลม แผ่นใบหนา ด้านหลังใบสีขาวนวลมีขน

ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง สีแดงอมเหลือง ทุกส่วนมีขน สีน้ำตาล กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง ปลายกลีบมีหนามขนาดเล็ก เกสรเพศผู้ มี 10 อัน มี 2 อัน ใหญ่กว่าอันอื่น

ผล ฝักแห้งแตก มีหนามแหลมที่ผิวทั่วไป รูปไข่กว้าง โคนเบี้ยวมักมีติ่งแหลมมี 1-3 เมล็ด มีเนื้อสีส้มหุ้มปลายอีกด้านหนึ่งของเมล็ด เมล็ดสีดำ เป็นมันและแข็งมาก

สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าชายหาด ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 400 ม.

สถานภาพ ไม้หวงห้ามธรรมดาประเภท ก.