

ส้มกบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hymenodictyon orixense* (Roxb.) Mabb.

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง ลาตา ลู สั้งเหาะ ส้มลู ส้มเห็ด อุโลก



ไม้ยืนต้น สูง 10-30 ม. ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างโปร่ง เปลือกของลำต้นชั้นนอกหนา แตกเป็นสะเก็ด สีน้ำตาล เปลือกในสีน้ำตาลแดง กระพี้สีขาว

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ออกเป็น กลุ่มตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปไข่กว้างหรือ รูปไข่กลับแกมรูปรี ขนาด 5-9 x 10-19 ซม. ปลายแหลม โคนมนสอบเล็กน้อย ขอบเรียบ ใบอ่อนมีขน ใบแก่เกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 6-9 เส้น ก้านใบยาว 1-6 ซม.

ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อหาวกระรอก ที่ ปลายกิ่ง ยาว 7-30 ซม. โคนช่อดอกมี ใบประดับ รูปใบพายรองรับ 1 คู่ กลีบเลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย ปลาย แยก 5 แฉก สีเขียว กลีบดอกรูปทรงคล้าย กลีบเลี้ยงแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย สีแดง เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านเกสรเพศเมีย ยื่นยาวเหนือวงกลีบ

ผล แห้งแตกกลางพู่ รูปรี ขนาดประมาณ 1 x 3 ซม. ปลายผลชี้ขึ้นไปทางก้านช่อผล

สภาพนิเวศ ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ทางภาคเหนือ ตะวันตก และภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 30-500 ม.

สถานภาพ -